

# CASO CLINICO 1

- Paciente masculino de 63 años de edad que consulta por claudicación en miembro
- Inferior derecho a los 200 mts.
- ANTECEDENTES:
  - Diabetes tipo II tratada con hipoglucemiantes orales.
  - Hipertensión arterial 150/90 tratado con Enalapril 5mg día.

# CASO CLINICO 1



Estenosis de 2cm



Balón de dilatación de 4 mm



Resultado post PTA

# Caso Clínico 2

Paciente de 76 años de edad de sexo femenino que consulta por claudicación en miembro inferior derecho a los 100 mts.

## ANTECEDENTES:

Hipertensión arterial. 190/90 tratada con Enalapril 10 mg.

Dislipidémica.

Ateromatosis carotidea.

No diabética ni fumadora. No Coronariopatía.

Hipotiroides tratada.

# CASO CLINICO 2



Lesión obstructiva



Stent viabahn



Recanalización completa  
Sin cirugía



Región poplítea y  
tibioperonea

# EVOLUCION

- Ambos pacientes presentaron francas mejoras en la irrigación del miembro inferior , evitando la realización de una cirugía.
- Control a la semana los pacientes refieren desaparición del dolor con recuperación del perímetro de marcha en 1000 mts.
- Se indica vasodilatadores , antiagregación y caminatas para recuperar la atrofia muscular por desuso y aumentar la vascularización distal